

Astrid-Mette Husøy og Ann Cathrine Kroksveen (red)

# **Blodprøvetaking i praksis**

**4. UTGAVE**

CAPPELEN DAMM AKADEMISK

## **Flervalgsoppgaver**

### **Kapittel 7**

## **Venøs prøvetaking**

- 1. Hvor lenge bør stasebåndet være strammet på pasientens arm ved venepunksjon?**
  - a. Omtrent 4 minutter
  - b. Til kanylen fjernes fra venen
  - c. Til hele venepunksjonen er fullført
  - d. Ikke mer enn 1 minutt
  
- 2. Å bruke stasebånd ved venøs prøvetaking er nyttig for å ...**
  - a. Få en indikasjon på størrelsen på venen
  - b. Distrahere pasienten fra ubehaget ved prosedyren
  - c. Få en indikasjon på hvor dypt venen ligger
  - d. Øke blodvolumet i venen, slik at venen er lettere å palpere/kjenne
  
- 3. Hvorfor kan det være hensiktsmessig å varme opp punksjonsstedet før blodprøvetaking?**
  - a. For å forhindre at venene ruller
  - b. For å få venene til å utvide seg
  - c. For å skape hemokonsentrasjon
  - d. For å øke den lokale blodstrømmen
  
- 4. I hvilken rekkefølge bør disse prøvetakingsrørene fylles?**
  - a. Blodkultur
  - b. EDTA-rør
  - c. Citratrør
  - d. Gelrør
  
- 5. Når bør sikkerhetsmekanismen på kanylen aktiveres under venepunksjon?**
  - a. Før prosedyren starter
  - b. Rett før man stikker pasienten, slik at ingen blir skadet
  - c. Umiddelbart etter at kanylen er ute av venen
  - d. Rett før man legger kanylen i avfallsbeholderen
  
- 6. Hvorfor er det viktig å blande prøvetakingsrørene med antikoagulant umiddelbart etter prøvetaking?**
  - a. For hindre at det dannes koagler
  - b. For å unngå metabolisme i cellene
  - c. Redusere risikoen for hemolyse
  - d. For å få en raskere koagulasjon
  
- 7. Hva betyr ødem?**
  - a. Infeksjon i huden
  - b. Nyresvikt
  - c. For mye blod eller væske i en blemme
  - d. Opphoping av væske i en del av kroppen
  
- 8. Hvis området rundt punksjonsstedet begynner å svulle, skyldes det vanligvis ...**
  - a. Hemokonsentrasjon
  - b. En sklerotisk vene
  - c. Et hematom
  - d. Synkope

**9. Hvilket av alternativene under beskriver deler av prosedyren for venøs prøvetaking i korrekt rekkefølge?**

- a. Stram stasebåndet, posisjoner armen, velg punksjonssted og desinfiser
- b. Før kanylen inn i venen, sett prøverøret inn i kanyleholderen, løs opp stasebåndet så snart blodet renner ned i prøvetakingsrøret
- c. Fjern kanylen, sett på plaster, merk prøverørene, skyv sikkerhetsskjoldet over kanylen og legg den i kanyleboks
- d. Velg vene, desinfiser huden, løs opp stasebåndet og før kanylen inn i venen