

Astrid-Mette Husøy og Ann Cathrine Kroksveen (red)

Blodprøvetaking i praksis

4. UTGAVE

CAPPELEN DAMM AKADEMISK

Fasit til flervalgsoppgaver

Kapittel 7

Venøs prøvetaking

- 1. Hvor lenge bør stasebåndet være strammet på pasientens arm ved venepunksjon?**
 - d. Ikke mer enn 1 minutt

- 2. Å bruke stasebånd ved venøs prøvetaking er nyttig for å ...**
 - d. øke blodvolumet i venen, slik at venen er lettere å palpere/kjenne

- 3. Hvorfor kan det være hensiktsmessig å varme opp punksjonsstedet før blodprøvetaking?**
 - b. Får å få venene til å utvide seg
 - d. For å øke den lokale blodstrømmen

- 4. I hvilken rekkefølge bør disse prøvetakingsrørene fylles?**

Riktig rekkefølge: a (blodkultur), c (citatrør), d (gelrør), b (EDTA-rør)

- 5. Når bør sikkerhetsmekanismen på kanylen aktiveres under venepunksjon?**
 - c. Umiddelbart etter at kanylen er ute av venen

- 6. Hvorfor er det viktig å blande prøvetakingsrørene med antikoagulant umiddelbart etter prøvetaking?**
 - a. For hindre at det dannes koagler

- 7. Hva betyr ødem?**
 - d. Opphoping av væske i en del av kroppen

- 8. Hvis området rundt punksjonsstedet begynner å svelle, skyldes det vanligvis ...**
 - b. Et hematom

- 9. Hvilket av alternativene under beskriver deler av prosedyren for venøs prøvetaking i korrekt rekkefølge?**
 - c. Før kanylen inn i venen, sett prøverøret inn i kanyleholderen, løs opp stasebåndet så snart blodet renner ned i prøvetakingsrøret